



	Dla niemowląt i małych dzieci		powyżej 1. roku życia			powyżej 1. roku życia			powyżej 1. roku życia			powyżej 1. roku życia			powyżej 1. roku życia		
GŁÓWNE CECHY	- dieta kompletna pod względem odżywczym - osmolarność: 336 mOsm/l - wysokoenergetyczna: 1 kcal/ml - białko: 2,6 g/100 ml (częściowo hydrolizowane białko serwatkowe) - laktoza: 6,4 g/100 ml - analogi tłuszczów mleka kobycego	- dieta kompletna pod względem odżywczym - osmolarność: 346 mOsm/l - wysokoenergetyczna: 1,5 kcal/ml - białko: 3 g/100 ml (źródłem białka są kazeina i białko serwatkowe) 28 witamin i składników mineralnych	- dieta kompletna pod względem odżywczym - osmolarność: 346 mOsm/l - wysokoenergetyczna: 1,5 kcal/ml - białko: 3 g/100 ml (źródłem białka są kazeina i białko serwatkowe) 28 witamin i składników mineralnych	- dieta kompletna pod względem odżywczym - osmolarność: 346 mOsm/l - wysokoenergetyczna: 1,5 kcal/ml - białko: 3 g/100 ml (źródłem białka są kazeina i białko serwatkowe) - zawiera błonnik: 0,5 g/100 ml 28 witamin i składników mineralnych	- dieta kompletna pod względem odżywczym - osmolarność przy 1 kcal/ml: 330 mOsm/l - możliwość indywidualnego dopasowania kaloryczności: 1,0-1,5 kcal/ml - białko: 13,9 g/100g proszku (źródłem białka są kazeina i białko serwatkowe) - zawiera błonnik rozpuszczalny: 2,5 g/100 g proszku - zawiera kultury bakterii: Lactobacillus paracasei i Bifidobacterium longum - kwasy tłuszczowe MCT stanowią 17% tłuszczów	- dieta kompletna pod względem odżywczym - osmolarność: 162 mOsm/l - normoenergetyczna: 1 kcal/ml - białko: 2 g/100 ml (źródłem białka są kazeina - 64% i białko serwatkowe - 36%) z dodatkami błonnika ISO[®]: 1 g/100 ml	- dieta kompletna pod względem odżywczym - osmolarność: 177 mOsm/l - normoenergetyczna: 1 kcal/ml - białko: 2 g/100 ml (źródłem białka są kazeina - 64% i białko serwatkowe - 36%) z dodatkami błonnika ISO[®]: 1 g/100 ml	- dieta kompletna pod względem odżywczym - osmolarność: 269 mOsm/l - wysokoenergetyczna: 1,5 kcal/ml - białko: 3,75 g/100 ml (źródłem białka są kazeina - 60% i białko serwatkowe - 40%) z dodatkami błonnika ISO[®]: 1 g/100 ml	- dieta kompletna pod względem odżywczym - osmolarność: 291 mOsm/l - wysokoenergetyczna: 1,5 kcal/ml - białko: 3,75 g/100 ml (źródłem białka są kazeina - 60% i białko serwatkowe - 40%) z dodatkami błonnika ISO[®]: 1 g/100 ml	- dieta kompletna pod względem odżywczym - osmolarność przy: 1 kcal/ml: 322 mOsm/l - możliwość indywidualnego dopasowania kaloryczności: 1-1,5 kcal/ml - białko: 13,7g/100 g proszku (źródłem białka jest hydrolizowane białko serwatkowe) - kwasy tłuszczowe MCT stanowią 53% tłuszczów	- dieta kompletna pod względem odżywczym - osmolarność: 280 mOsm/l - normoenergetyczna: 1 kcal/ml - białko: 3 g/100 ml (źródłem białka jest hydrolizowane białko serwatkowe) - kwasy tłuszczowe MCT stanowią 60% tłuszczów	- dieta kompletna pod względem odżywczym - osmolarność: 415 mOsm/l - wysokoenergetyczna: 1,5 kcal/ml - białko: 4,5 g/100 ml (źródłem białka jest hydrolizowane białko serwatkowe) - błonnik: 0,7 g/100 ml - kwasy tłuszczowe MCT stanowią 60% tłuszczów					
WSKAZANIA	Do postępowania dietetycznego u niemowląt i małych dzieci ze zwiększonym zapotrzebowaniem energetycznym, np. w przebiegu chorób przewlekłych, takich jak: - choroby nerek - choroby krwi - choroby kardiologiczne - choroby pulmonologiczne - choroby neurologiczne - choroby onkologiczne Infasource może być także stosowany w stanach ostrych, takich jak: infekcje, sepsa, transplantacje, urazy, OIT i okres okołoperacyjny.	Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia lub w przypadku ryzyka niedożywienia, np.: - zwiększone zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze - upośledzenie procesu wzrastania - brak apetytu - niezamierzona utrata masy ciała - zaburzenia żucia i połykania - mukowiscydoza - okres rekonwalescencji - jadłowstręt psychiczny	Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia lub w przypadku ryzyka niedożywienia, np.: - zwiększone zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze - upośledzenie procesu wzrastania - brak apetytu - niezamierzona utrata masy ciała - zaburzenia żucia i połykania - mukowiscydoza - okres rekonwalescencji - jadłowstręt psychiczny	Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia lub w przypadku ryzyka niedożywienia, np.: - zwiększone zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze - upośledzenie procesu wzrastania - brak apetytu - niezamierzona utrata masy ciała - zaburzenia żucia i połykania - mukowiscydoza - okres rekonwalescencji - jadłowstręt psychiczny	Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia lub w przypadku ryzyka niedożywienia, np.: - zwiększone zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze - chorobach wyniszczających - przygotowaniu do zabiegów operacyjnych i żywieniu po operacji, rekonwalescencji - zwiększonym zapotrzebowaniu na energię i składniki odżywcze - chorobach neurologicznych - anoreksji - upośledzeniu procesu wzrastania - zaburzeniach perystaltyki jelit Do podawania doustnie lub przez zgłębnik.	Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia lub w przypadku ryzyka niedożywienia, np. w: - zwiększonym zapotrzebowaniu na składniki odżywcze - chorobach wyniszczających - przygotowaniu do zabiegów operacyjnych i żywieniu po operacji, rekonwalescencji - zwiększonym zapotrzebowaniu na energię i składniki odżywcze - chorobach neurologicznych - anoreksji - upośledzeniu procesu wzrastania - zaburzeniach perystaltyki jelit Do podawania doustnie lub przez zgłębnik.	Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia lub w przypadku ryzyka niedożywienia, np. w: - zwiększonym zapotrzebowaniu na składniki odżywcze - chorobach wyniszczających - przygotowaniu do zabiegów operacyjnych i żywieniu po operacji, rekonwalescencji - zwiększonym zapotrzebowaniu na energię i składniki odżywcze - chorobach neurologicznych - anoreksji - upośledzeniu procesu wzrastania - zaburzeniach perystaltyki jelit Do podawania doustnie lub przez zgłębnik.	Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia lub w przypadku ryzyka niedożywienia, np. w: - zwiększonym zapotrzebowaniu na składniki odżywcze - chorobach wyniszczających - przygotowaniu do zabiegów operacyjnych i żywieniu po operacji, rekonwalescencji - zwiększonym zapotrzebowaniu na energię i składniki odżywcze - chorobach neurologicznych - anoreksji - upośledzeniu procesu wzrastania - zaburzeniach perystaltyki jelit Do podawania doustnie lub przez zgłębnik.	Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia lub w przypadku ryzyka niedożywienia, np. w: - zwiększonym zapotrzebowaniu na składniki odżywcze - chorobach wyniszczających - przygotowaniu do zabiegów operacyjnych i żywieniu po operacji, rekonwalescencji - zwiększonym zapotrzebowaniu na energię i składniki odżywcze - chorobach neurologicznych - anoreksji - upośledzeniu procesu wzrastania - zaburzeniach perystaltyki jelit Do podawania doustnie lub przez zgłębnik.	Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia lub w przypadku ryzyka niedożywienia, np. w: - zwiększonym zapotrzebowaniu na składniki odżywcze - chorobach wyniszczających - przygotowaniu do zabiegów operacyjnych i żywieniu po operacji, rekonwalescencji - zwiększonym zapotrzebowaniu na energię i składniki odżywcze - chorobach neurologicznych - anoreksji - upośledzeniu procesu wzrastania - zaburzeniach perystaltyki jelit Do podawania doustnie lub przez zgłębnik.	Do postępowania dietetycznego w przypadku niedożywienia związanego z chorobą, u pacjentów z zaburzeniami wchłaniania i / lub trawienia, np. w: - zwiększone zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze - opóźnione opróżnianie żołądka - nieswoiste zapalenia jelit - zespoli krótkiego jelita - zespołu krótkiego jelita - przetokach jelitowych - popromiennym zapaleniu jelit - zapałeniu trzustki - oparzeniach - mukowiscydozie - chorobach wątroby - choroby kardiologiczne - niepowodzeniu żywienia produktami pełnobiałkowymi - zapalenie trzustki przejsię z żywienia pozajelitowego na dojelitowe Do podawania doustnie lub przez zgłębnik.	Do postępowania dietetycznego w przypadku niedożywienia związanego z chorobą, u pacjentów z zaburzeniami wchłaniania i / lub trawienia, np. w: - zwiększone zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze - opóźnione opróżnianie żołądka - nieswoiste zapalenia jelit - zespołu krótkiego jelita - przetokach jelitowych - popromiennym zapaleniu jelit - zapałeniu trzustki - oparzeniach - mukowiscydozie - chorobach wątroby - niepowodzeniu żywienia produktami pełnobiałkowymi - zapalenie trzustki przejsię z żywienia pozajelitowego na dojelitowe Do podawania doustnie lub przez zgłębnik.	Do postępowania dietetycznego w przypadku niedożywienia związanego z chorobą, u pacjentów z zaburzeniami wchłaniania i / lub trawienia, np. w: - zwiększone zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze - opóźnione opróżnianie żołądka - nieswoiste zapalenia jelit - zespołu krótkiego jelita - przetokach jelitowych - popromiennym zapaleniu jelit - zapałeniu trzustki - oparzeniach - mukowiscydozie - chorobach wątroby - niepowodzeniu żywienia produktami pełnobiałkowymi - zapalenie trzustki przejsię z żywienia pozajelitowego na dojelitowe Do podawania doustnie lub przez zgłębnik.				
ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH SKŁADNIKÓW DIETY	2,6 g białka/100 ml 10 g węglowodanów/100 ml (w tym: 6,4 g laktozy/100 ml)	3 g białka/100 ml 21 g węglowodanów/100 ml	3 g białka/100 ml 21 g węglowodanów/100 ml	3 g białka/100 ml 21 g węglowodanów/100 ml	13,9 g białka/100 g 60,7 g węglowodanów/100 g 2,5 g błonnika/100 g	2 g białka/100 ml 13 g węglowodanów/100 ml	2 g białka/100 ml 12,5 g węglowodanów/100 ml 1 g błonnika/100 ml	3,75 g białka/100 ml 18,3 g węglowodanów/100 ml 1 g błonnika/100 ml	3,75 g białka/100 ml 18,3 g węglowodanów/100 ml 1 g błonnika/100 ml	3,75 g białka/100 ml 18,3 g węglowodanów/100 ml 1 g błonnika/100 ml	13,7 g białka/100 g 60% tłuszczów w postaci MCT 62,8 g węglowodanów/100 g	3 g białka/100 ml 60% tłuszczów w postaci MCT 13 g węglowodanów/100 ml	4,5 g białka/100 ml 60% tłuszczów w postaci MCT 18 g węglowodanów/100 ml				
PROCENTOWY UDZIAŁ ENERGII	białko - 10% tłuszcz - 50% węglowodany - 40%	białko - 8% tłuszcz - 37% węglowodany - 55%	białko - 8% tłuszcz - 37% węglowodany - 55%	białko - 8% tłuszcz - 40% węglowodany - 52% błonnik - 1%	białko - 12% tłuszcz - 35% węglowodany - 52% błonnik - 1%	białko - 8% tłuszcz - 40% węglowodany - 50% błonnik - 2%	białko - 10% tłuszcz - 40% węglowodany - 49% błonnik - 1%	białko - 12% tłuszcz - 34% węglowodany - 54%	białko - 12% tłuszcz - 36% węglowodany - 52%	białko - 12% tłuszcz - 39% węglowodany - 48% błonnik - 1%	białko - 12% tłuszcz - 39% węglowodany - 48% błonnik - 1%	białko - 12% tłuszcz - 36% węglowodany - 52%	białko - 12% tłuszcz - 36% węglowodany - 52%	białko - 12% tłuszcz - 39% węglowodany - 48% błonnik - 1%			
SMAKI	• neutralny	• truskawkowy	• waniliowy	• czekoladowy	• waniliowy	• neutralny	• neutralny	• neutralny	• neutralny	• neutralny	• waniliowy	• neutralny	• neutralny				
POSTAĆ I OPAKOWANIE	płyn, butelka 90 ml	płyn, 4 butelki x 200 ml	płyn, 4 butelki x 200 ml	płyn, 4 butelki x 200 ml	proszek, puszka 400 g	płyn, butelka Smartflex 500 ml	płyn, butelka Smartflex 500 ml	płyn, butelka Smartflex 500 ml	płyn, butelka Smartflex 500 ml	płyn, butelka Smartflex 500 ml	proszek, puszka 400 g	płyn, butelka Smartflex 500 ml	płyn, butelka Smartflex 500 ml				
WSKAZANIA WIEKOWE	Dla niemowląt i małych dzieci ze zwiększonym zapotrzebowaniem energetycznym	Odpowiedni powyżej 1. roku życia	Odpowiedni powyżej 1. roku życia	Odpowiedni powyżej 1. roku życia	Odpowiedni powyżej 1. roku życia	Odpowiedni powyżej 1. roku życia	Odpowiedni powyżej 1. roku życia	Odpowiedni powyżej 1. roku życia	Odpowiedni powyżej 1. roku życia	Odpowiedni powyżej 1. roku życia	Odpowiedni powyżej 1. roku życia	Odpowiedni powyżej 1. roku życia	Odpowiedni powyżej 1. roku życia				
SUGEROWANE DAWKOWANIE	Indywidualnie w zależności od zapotrzebowania dziecka lub zgodnie z zaleceniem lekarza	1-3 butelki na dobę jako uzupełnienie diety lub zgodnie z zaleceniem lekarza	1-3 butelki na dobę jako uzupełnienie diety lub zgodnie z zaleceniem lekarza	1-3 butelki na dobę jako uzupełnienie diety lub zgodnie z zaleceniem lekarza	Indywidualnie, zgodnie z zapotrzebowaniem dziecka lub zgodnie z zaleceniem lekarza	od 1 do 4 butelek 500 ml w zależności od zapotrzebowania dziecka lub zgodnie z zaleceniem lekarza	od 1 do 4 butelek 500 ml w zależności od zapotrzebowania dziecka lub zgodnie z zaleceniem lekarza	od 1 do 3 butelek 500 ml w zależności od zapotrzebowania dziecka lub zgodnie z zaleceniem lekarza	od 1 do 3 butelek 500 ml w zależności od zapotrzebowania dziecka lub zgodnie z zaleceniem lekarza	500-2000 ml produktu o wartości energetycznej 1,0 kcal / ml, w zależności od zapotrzebowania dziecka lub zgodnie z zaleceniem lekarza	1-4 butelki 500 ml dziennie w zależności od zapotrzebowania dziecka lub zgodnie z zaleceniem lekarza	1-4 butelki 500 ml dziennie w zależności od zapotrzebowania dziecka lub zgodnie z zaleceniem lekarza	1-3 butelki 500 ml dziennie w zależności od zapotrzebowania dziecka lub zgodnie z zaleceniem lekarza				
DODATKOWE INFORMACJE	- produkt bezglutenowy - nieodpowiedni w przypadku alergii na białka mleka krowiego - karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt	- zawartość laktozy <0,3 g/100 ml - produkt bezglutenowy	- zawartość laktozy <0,3 g/100 ml - produkt bezglutenowy	- zawartość laktozy <0,3 g/100 ml - produkt bezglutenowy	- zawartość laktozy <0,4 g/100 g - produkt bezglutenowy	- zawartość laktozy <0,3 g/100 ml - produkt bezglutenowy	- zawartość laktozy <0,3 g/100 ml - produkt bezglutenowy	- zawartość laktozy <0,5 g/100 ml - produkt bezglutenowy	- zawartość laktozy <0,5 g/100 ml - produkt bezglutenowy	- zawartość laktozy <0,5 g/100 ml - produkt bezglutenowy	- zawartość laktozy <0,4 g/100 g - produkt bezglutenowy - nie zawiera błonnika	- zawartość laktozy <0,1 g/100 ml - produkt bezglutenowy	- zawartość laktozy <0,2 g/100 g - produkt bezglutenowy				

 www.nestlehealthscience.pl

 Poradnik Żywienia Medycznego
www.facebook.com/poradnikzywieniaamedycznego

* Oferta producenta InfoSource nie zawiera saszki.	
1. Resource Protein o smaku czekoladowym ma osmolarność 450 mOsm/l.	SUGEROWANA DAWKA
2. Resource Protein o smaku czekoladowym zawiera błonnik <0,5g/100ml.	
3. Resource 2.0 o smaku czekolada-mięta zawiera 21,0 g węglowodanów/100 ml.	
4. Resource 2.0 o smaku czekolada-mięta zawiera białek <1 g/100 ml.	
Zywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Stosować pod kontrolą lekarza. Materiał przeznaczony dla środowiska medycznego.	
* Wszystkie znaki towarowe należą do Société des produits Nestlé S.A., Vevey, Szwajcaria. Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa	Numer materiału ONS/5/2021
	DODATKOWE INFORMACJE

GŁÓWNE CECHY	- dieta kompletna pod względem odżywczym ● osmolarność: 390 mOsm/l ⁽¹⁾ ● wartość energetyczna: 1,25 kcal/ml ● wysokobiałkowa: 9,4 g/100 ml (źródłem białka są kazeina i białko serwatkowe)	- dieta kompletna pod względem odżywczym ● osmolarność: 520 mOsm/l ● wysokoenergetyczna: 2 kcal/ml ● normobiałkowa: 9 g/100 ml (źródłem białka są kazeina i białko serwatkowe)	- dieta kompletna pod względem odżywczym ● osmolarność: 520 mOsm/l ● wysokoenergetyczna: 2 kcal/ml ● normobiałkowa: 9 g/100 ml (źródłem białka są kazeina i białko serwatkowe) ● z dodatkami błonnika: 2,5 g/100 ml	- dieta niekompletna pod względem odżywczym ● osmolarność: 615 mOsm/100 ml ● wysokoenergetyczna: 1,5 kcal/ml ● normobiałkowa: 5 g/100 ml (źródłem białka jest białko serwatkowe)	- dieta cząstkowa ● koncentrat białka w proszku (źródłem białka jest kazeina)	- dieta cząstkowa ● częściowo hydrolizowana guma guar (PHGG) w proszku	- dieta kompletna pod względem odżywczym ● osmolarność: 239 mOsm/l ● normoenergetyczna: 1 kcal/ml ● normobiałkowa: 3,9 g/100 ml (źródłem białka jest kazeina)	- dieta kompletna pod względem odżywczym ● osmolarność: 266 mOsm/l ● wysokoenergetyczna: 1,6 kcal/ml ● normobiałkowa: 3,9 g/100 ml (źródłem białka jest kazeina) ● z dodatkami błonnika: 1,5 g/100 ml	- dieta kompletna pod względem odżywczym ● osmolarność: 283 mOsm/l ● wysokoenergetyczna: 1,3 kcal/ml ● wysokobiałkowa: 6,7 g/100 ml (źródłem białka jest kazeina)	- dieta kompletna pod względem odżywczym ● osmolarność: 372 mOsm/l ● wysokoenergetyczna: 2 kcal/ml ● normobiałkowa: 6,1 g/100 ml (źródłem białka jest kazeina)	- dieta kompletna pod względem odżywczym ● osmolarność: 360 mOsm/l ● wysokoenergetyczna: 2 kcal/ml ● wysokobiałkowa: 10 g/100 ml (źródłem białka są kazeina i białko serwatkowe) ● 40% tłuszczu w postaci MCT ● z dodatkami błonnika: 2 g/100 ml	- dieta kompletna pod względem odżywczym ● osmolarność: 395 mOsm/l ● wysokoenergetyczna: 2 kcal/ml ● wysokobiałkowa: 10 g/100 ml (źródłem białka są kazeina i białko serwatkowe) ● 40% tłuszczu w postaci MCT ● z dodatkami błonnika: 2 g/100 ml	- dieta kompletna pod względem odżywczym ● osmolarność przy 1 kcal/ml: 290 mOsm/l ● normoenergetyczna: 1 kcal/ml ● normobiałkowa: 17,5 g/100 g proszku (źródłem białka jest kazeina) ● zawiera transformujący czynnik wzrostu TGF-β2 ● 26% tłuszczu w postaci MCT	
WSKAZANIA	Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia i/lub w przypadku ryzyka niedożywienia, któremu może towarzyszyć zwiększone zapotrzebowanie na białko, np. w: ● chorobie nowotworowej ● mukowiscydozie ● chorobach nowotworowej oparzeniach ● okresie okołoperacyjnym	Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia i/lub w przypadku ryzyka niedożywienia, np. w: ● chorobie nowotworowej ● mukowiscydozie ● problemach z żuciem i pokrywaniem ● jadowłóstrecie psychicznym ● zwiększonym zapotrzebowaniu na energię i składniki odżywcze	Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia i/lub w przypadku ryzyka niedożywienia, np. w: ● chorobie nowotworowej ● mukowiscydozie ● zaburzeniach perystaltyki jelit ● problemach z żuciem i pokrywaniem ● jadowłóstrecie psychicznym ● zwiększonym zapotrzebowaniu na energię i składniki odżywcze	Do postępowania dietetycznego u pacjentów z zaburzeniami w zaburzeniami z radioterapią lub chemioterapią, niedożywionych lub z ryzykiem wystąpienia niedożywienia.	Do postępowania dietetycznego u pacjentów w stanach niedożywienia lub w przypadku ryzyka niedożywienia, u których może występować zwiększone zapotrzebowanie na białko.	Do postępowania dietetycznego u pacjentów z zaburzeniami funkcjonowania jelita grubego w celu ułatwienia wydalania resztek pokarmowych w zaparciach.	Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia lub ryzyku niedożywienia np. w: ● braku lub ograniczeniu możliwości normalnego odżywiania ● dysfagii neurologicznej ● okresie rekonwalescencji ● jadowłóstrecie psychicznym Do podawania doustnie lub przez zgłąbnik.	Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia lub ryzyku niedożywienia, np. w: ● braku lub ograniczeniu możliwości normalnego odżywiania ● dysfagii neurologicznej ● zaburzeniach perystaltyki jelit ● okresie rekonwalescencji ● jadowłóstrecie psychicznym Do podawania doustnie lub przez zgłąbnik.	Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia lub ryzyku niedożywienia u pacjentów wymagających diety wysokobiałkowej, np. w: ● chorobie nowotworowej lub innych chorobach wyniszczających ● przygotowaniu do zabiegów operacyjnych ● oparzeniach ● odleżynach ● infekcjach o ciężkim przebiegu Do podawania doustnie lub przez zgłąbnik.	Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia lub ryzyku niedożywienia u pacjentów wymagających diety wysokobiałkowej lub płynnej np. w: ● zwiększonym zapotrzebowaniu na energię i składniki odżywcze ● chorobach neurologicznych ● chorobach onkologicznych ● jadowłóstrecie psychicznym ● chorobach kardiologicznych Do podawania doustnie lub przez zgłąbnik.	Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia lub ryzyku niedożywienia u pacjentów, którym zaleca się dietę wysokoenergetyczną lub dietę z ograniczoną podażą płynów, np. w: ● chorobach neurologicznych ● chorobach onkologicznych ● urazy czaszkowo – mózgowe ● pacjent poddawany rehabilitacji ● niewydolność serca ● niewydolność wątroby ● terapia nerkozastępcza Do podawania doustnie lub przez zgłąbnik.	Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia lub ryzyku niedożywienia u pacjentów, którym zaleca się dietę wysokoenergetyczną lub dietę z ograniczoną podażą płynów, np. w: ● chorobach neurologicznych ● chorobach onkologicznych ● urazy czaszkowo – mózgowe ● pacjent poddawany rehabilitacji ● niewydolność serca ● niewydolność wątroby ● terapia nerkozastępcza Do podawania doustnie lub przez zgłąbnik.	Do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia lub ryzyku niedożywienia u pacjentów, którym zaleca się dietę wysokoenergetyczną lub dietę z ograniczoną podażą płynów, np. w: ● chorobach neurologicznych ● chorobach onkologicznych ● urazy czaszkowo – mózgowe ● pacjent poddawany rehabilitacji ● niewydolność serca ● niewydolność wątroby ● terapia nerkozastępcza Do podawania doustnie lub przez zgłąbnik.	Do postępowania dietetycznego w chorobie Leśniowskiego-Crohna . Odpowiedni powyżej 5. roku życia. Wskazania refundacyjne: ● indukcja remisji u dzieci i młodzieży powyżej 5. roku życia z czynną postacią choroby Leśniowskiego-Crohna
ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH SKŁADNIKÓW DIETY	● 9,4 g białka/100 ml ● 14 g węglowodanów/100 ml	● 9 g białka/100 ml ● 21,4 g węglowodanów/100 ml⁽³⁾	● 9 g białka/100 ml ● 20 g węglowodanów/100 ml ● 2,5 g błonnika/100 ml	● 5 g białka/100 ml ● 32,5 g węglowodanów/100 ml	● 1 łyżka stołowa (5 g) = 4,5 g białka	● częściowo hydrolizowana guma guar	● 3,9 g białka/100 ml ● 15,3 g węglowodanów/100 ml	● 3,9 g białka/100 ml ● 1,5 g błonnika/100 ml ● 13,5 g węglowodanów/100 ml	● 6,7 g białka/100 ml ● 21,9 g węglowodanów/100 ml	● 6,1 g białka/100 ml ● 21,9 g węglowodanów/100 ml	● 10 g białka/100 ml ● 20 g węglowodanów/100 ml ● 2 g błonnika/100 ml	● 10 g białka/100 ml ● 20 g węglowodanów/100 ml ● 2 g błonnika/100 ml	● 17,5 g białka/100 g ● 54 g węglowodanów/100 g	
PROCENTOWY UDZIAŁ ENERGII	białko - 30% tłuszcz - 25% węglowodany - 45%	białko - 18% tłuszcz - 39% węglowodany - 43%	białko - 18% tłuszcz - 39% węglowodany - 40% błonnik - 3%	białko - 13% węglowodany - 87%	białko - 97% tłuszcz - 2% węglowodany - 1%	białko - 3% węglowodany - 12% błonnik - 85%	białko - 16% tłuszcz - 30% węglowodany - 54%	białko - 15% tłuszcz - 30% węglowodany - 52% błonnik - 3%	białko - 21% tłuszcz - 30% węglowodany - 49%	białko - 16% tłuszcz - 35% węglowodany - 49%	białko - 20% tłuszcz - 38% węglowodany - 42%	białko - 20% tłuszcz - 38% węglowodany - 40% błonnik - 2%	białko - 14% tłuszcz - 42% węglowodany - 44%	
SMAKI	● truskawkowy ● owoców leśnych ● waniliowy ● morelowy ● czekoladowy ^(1,2)	● waniliowy ● morelowy ● ananas-mango ● czekolada-mięta ^(3,4)	● owoców leśnych ● kawa	● herbaty brzoskwiniowo-miętowej	● neutralny (nie zmienia smaku i zapachu potraw)	● bez smaku ● bez tekstury ● bez zapachu	● neutralny	● neutralny	● neutralny	● neutralny	● neutralny	● neutralny	● neutralny	● neutralny
POSTAĆ I OPAKOWANIE	płyn, 4 butelki x 200 ml	płyn, 4 butelki x 200 ml	płyn, 4 butelki x 200 ml	płyn, 4 butelki x 200 ml	proszek, puszka 400 g	proszek, puszka 125 g	płyn, butelka Smartflex 500 ml lub 1000 ml	płyn, butelka Smartflex 500 ml lub 1000 ml	płyn, butelka Smartflex 500 ml	płyn, butelka Smartflex 500 ml	płyn, butelka Smartflex 500 ml	płyn, butelka Smartflex 500 ml	proszek, puszka 400 g	
WSKAZANIA WIEKOWE	Odpowiedni powyżej 3. roku życia	Odpowiedni powyżej 3. roku życia	Odpowiedni powyżej 3. roku życia	Odpowiedni powyżej 3. roku życia	Odpowiedni powyżej 3. roku życia	Odpowiedni powyżej 3. roku życia	Odpowiedni powyżej 3. roku życia	Odpowiedni powyżej 3. roku życia	Odpowiedni powyżej 3. roku życia	Odpowiedni powyżej 3. roku życia	Odpowiedni powyżej 3. roku życia	Odpowiedni powyżej 3. roku życia	Odpowiedni powyżej 3. roku życia	Odpowiedni powyżej 5. roku życia
SUGEROWANE DAWKOWANIE	1-3 butelki na dobę jako uzupełnienie diety lub zgodnie z zaleceniem lekarza	1-3 butelki na dobę jako uzupełnienie diety lub zgodnie z zaleceniem lekarza	1-3 butelki na dobę jako uzupełnienie diety lub zgodnie z zaleceniem lekarza	1-3 butelki na dobę jako uzupełnienie diety	Zgodnie z zaleceniem lekarza. Na 150 ml płynu lub 150 g potrawy należy dodać 10-15 g proszku (2-3 łyżki stołowe - ilość należy dostosować do wieku, potrzeb oraz stanu pacjenta)	Zaczynj od ½ dawki dziennie, w razie potrzeby zwiększ do 1 dawki lub zgodnie z zaleceniem lekarza	3 lub 4 butelki 500 ml jako wyłączone żywienie lub ≥ 1 butelki 500 ml jako żywienie uzupełniające lub zgodnie z zaleceniem lekarza	3 lub 4 butelki 500 ml jako wyłączone żywienie lub 1 butelki 500 ml jako żywienie uzupełniające lub zgodnie z zaleceniem lekarza	3 lub 4 butelki 500 ml jako wyłączone żywienie lub ≥ 1 butelki 500 ml jako żywienie uzupełniające lub zgodnie z zaleceniem lekarza	3 lub 4 butelki 500 ml jako wyłączone żywienie lub ≥ 1 butelki 500 ml jako żywienie uzupełniające lub zgodnie z zaleceniem lekarza	3 lub 4 butelki 500 ml jako wyłączone żywienie lub ≥ 1 butelki 500 ml jako żywienie uzupełniające lub zgodnie z zaleceniem lekarza	3 lub 4 butelki 500 ml jako wyłączone żywienie lub ≥ 1 butelki 500 ml jako żywienie uzupełniające lub zgodnie z zaleceniem lekarza	3 lub 4 butelki 500 ml jako wyłączone żywienie lub ≥ 1 butelki 500 ml jako żywienie uzupełniające lub zgodnie z zaleceniem lekarza	Indywidualne, zgodnie z zapotrzebowaniem pacjenta
DODATKOWE INFORMACJE	● zawartość laktozy <0,5 g/100 ml ● produkt bezglutenowy	● zawartość laktozy <0,5 g/100 ml ● produkt bezglutenowy	● zawartość laktozy <1 g/100 ml ● produkt bezglutenowy	● zawartość laktozy <0,5 g/100 ml ● produkt bezglutenowy	● zawartość laktozy <0,5 g/100 g	● nie zawiera laktozy ● produkt bezglutenowy	● zawartość laktozy <0,05 g/100 ml ● produkt bezglutenowy	● zawartość laktozy <0,05 g/100 ml ● produkt bezglutenowy	● zawartość laktozy <0,05 g/100 ml ● produkt bezglutenowy	● zawartość laktozy <0,05 g/100 ml ● produkt bezglutenowy	● zawartość laktozy <0,05 g/100 ml ● produkt bezglutenowy	● zawartość laktozy <0,05 g/100 ml ● produkt bezglutenowy	● zawartość laktozy <0,05 g/100 ml ● produkt bezglutenowy	● zawartość laktozy <0,5 g/100 g ● produkt bezglutenowy



Optymalny rozwój dziecka

TO RÓWNIEŻ KWESTIA DOPASOWANIA
WŁAŚCIWEJ DIETY

